



Caring Innovation

## دليل خطوة بخطوة للحقن الذاتي في المنزل (للحقن تحت الجلد)



يرجى مسح الرمز للوصول إلى  
أدلة فيديو الحقن الذاتي:

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع:  
**WWW.IBSAPHARMA.CO.UK**

## مقدمة

قبل بدء العلاج، تتحقق من محتويات مجموعة أدوات الرعاية المنزلية الخاصة بك للتأكد من وجود الأدوات التالية:

- |                                 |
|---------------------------------|
| 20 محققاً سعة 2 مل              |
| 20 إبرة سحب خضراء               |
| 20 إبرة حقن صغيرة               |
| 20 فتحة أمبولات بلاستيكية شفافة |
| 1 حاوية أدوات حادة بلاستيكية    |

ثبتي الجزء العلوي بإحكام على قاعدة حاوية الأدوات الحادة، لكن لا تغلق الغطاء.

تحقق أن لديك العدد والتركيز الصحيحين من قوارير دواء الخصوبة على النحو المحدد في الوصفة الطبية الخاصة بك.

يجب أن يكون عدد أمبولات المذيب لديك مساوياً لعدد قوارير دواء الخصوبة.

سيكون أحد الإخصائين قد تحدث معك بالفعل عن كيفية الحقن الذاتي للحقن في المنزل واستعمال حاوية الأدوات الحادة. هذا الكتيب ومجموعة الأدوات التي يشير إليها مخصصان لطريقة الحقن تحت الجلد.

عند انتهاء حاوية الأدوات الحادة أو انتهاءك من دورة العلاج بالكامل، أغلقي غطاء حاوية الأدوات الحادة بإحكام وتخلصي منه وفقاً لتعليمات العيادة.

قبل بدء استعمال أول حقنة، اغسل يديك واحرصي على تجهيز سطح عمل نظيف لوضع جميع العناصر التي تحتاجين إليها:-

- |                               |
|-------------------------------|
| .1 فتحة أمبولة واحدة          |
| .2 محقن واحد سعة 2 مل         |
| .3 إبرة سحب خضراء طويلة واحدة |
| .4 إبرة حقن صغيرة قصيرة واحدة |
| .5 الدواء الخاص بك            |

في حالة تلف عبوة الإبر أو المحقق أو تعرض السداد المحكم المعقمة للكسر، فلا تستخدمني تلك المحقق أو الإبر، ولكن تخلصي منها في حاوية الأدوات الحادة.

ضعي العدد الصحيح من القوارير (الدواء) والأمبولات (المذيب) اللازمة لإعداد حقنتك الأولى على سطح العمل المجهز.

## 1. تحضير المحقن والإبرة



انزع عي غلاف إبرة سحب خضراء طويلة.

أخرج جي محققًا واحدًا من عبوته.

ثبتي إبرة السحب بالمحقن، مع ترك الغطاء الواقي للإبرة في موضعه.

ضعى المحقن والإبرة على سطح العمل.

## 2. فتح أمبولة المذيب



أسفل النقطة الملونة المرئية على عنق الأمبولة، تم حزّ الزجاج لتسهيل كسره. خذى أمبولة مذيب وانقري برفق على القسم العلوي بحيث يسقط أي سائل متجمع في الأعلى إلى قاع الأمبولة.

أمسكى الأمبولة بيد واحدة، بحيث تكون النقطة موجهة بعيداً عنك، وباليد الأخرى ضعى الطرف الضيق لفتحة الأمبولة باحكام فرق القسم العلوي للأمبولة حتى ينطبق عليه مصدرًا صوت طقطقة.

أمسكى القسم السفلي للأمبولة بإحكام بأخذى يديك ثم اكسرى القسم العلوي للأمبولة بسحب فتحة الأمبولة تجاهك بيدك الأخرى.

ضعى الأمبولة المفتوحة على سطح العمل. تخلصى من الطرف المكسور وفتحة الأمبولة فى حاوية الأدوات الحادة.

## 3. سحب المذيب إلى المحقن



خذى المحقن الذى قمت بتحضيره وانزع عي غطاء الإبرة.

أمسكى المحقن بيد واحدة والأمبولة المفتوحة بيدك الأخرى، وضعى الإبرة في المذيب. اسحبى كل السائل في المحقن، واحرصى على إبقاء طرف الإبرة تحت سطح السائل. فهذا يقلل من فرصة دخول الهواء إلى المحقن.

ضعى الغطاء الواقي على الإبرة وتخلصى من الأمبولة الفارغة في حاوية الأدوات الحادة.

## 4. تحضير الدواء للحقن

خذى قارورة دواء (مسحوق أبيض) وانزعى الغطاء البلاستيكي الواقى، لكشف الغشاء المطاطى أعلى القارورة.

خذى المحقن وانزعى الغطاء الواقى من الإبرة.

اثقنى الغشاء المطاطى أعلى القارورة بواسطة الإبرة، واحقني السائل ببطء لأسفل داخل القارورة في المسحوق الأبيض.

ينبوب المسحوق الأبيض على الفور دون الحاجة إلى رج القارورة.

اسحبى المحلول ببطء في المحقن.

إذا ظهر لك أكثر من قارورة واحدة من الدواء لكل حقنة، فمن ثم احقنى المحلول الموجود بالفعل في المحقن داخل القارورة التالية، وكررى الخطوة رقم 4.

تحتوي النشرة الموجودة في عبوة الدواء على معلومات تتعلق بالحد الأقصى لعدد القوارير التي يمكن إذابتها في أمبولة واحدة (1 مل) من المذيب.



## 5. تحضير المحقن للحقن

عند سحب محتويات العدد الصحيح من القوارير في المحقن:

اسحبى المكبس قليلاً للخلف للتأكد من عدم وجود أي سائل متبقى في الإبرة.

ضعى الغطاء الواقى على إبرة السحب.

افصلى إبرة السحب من المحقن وتخلصى منها في حاوية الأدوات الحادة جنبًا إلى جنب مع القوارير الفارغة.

أخرجى إبرة الحقن الصفراء القصيرة من العبوة وثبتتها بإحكام بالمحقن.



## 6. إعطاء الحقنة يدوياً

انزع عي الغطاء الواقي للإبرة وافحصي المحقن بحثاً عن آية فقاعات هوائية.

أمسكي المحقن مع توجيه الإبرة لأعلى وانقري المحقن بإصبعيك برفق حتى تنتجمع كل الفقاعات في الأعلى.

ادفعي مكبس المحقن برفق حتى يتم طرد جميع الفقاعات وتخرج قطرة من السائل في نهاية الإبرة.

أنت الآن مستعدة لإعطاء الحقنة والتي يجب أخذها على الفور.

سيخبرك الإخصائي بموضع الحقن، على سبيل المثال البطن والجزء الأمامي من الفخذ - وكيفية تجهيز موضع الحقن.

جهزي موضع الحقن الذي قمت باختياره على النحو الموصى به من الإخصائي.



اقرصي الجلد بإحكام بين إصبعيك وأندلي الإبرة بزاوية تتراوح بين 45° و 90°، عن طريق الحقن تحت الجلد كما تعلمت.

لا تحقني مباشرة في آية أوردة.

احقني المحلول بدفع المكبس، مع أخذ كل الوقت اللازم لحقن المحلول بالكامل.

اسحبِي الإبرة ونظفي الجلد على النحو الموصى به من الإخصائي.

تخلاصي من المحقن وإبرة الحقن المستعملين وأية أمبولات أو قوارير فارغة متبقية في حاوية الأدوات الحادة.



عند امتلاء حاوية الأدوات الحادة أو انتهاءك من دورة العلاج بالكامل،أغلقي غطاء حاوية الأدوات الحادة بإحكام وتخلاصي منه وفقاً لتعليمات العيادة.



Caring Innovation

## الآثار الجانبية

إذا واجهت أية آثار جانبية، فتحثني إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة. ويتضمن ذلك أية آثار جانبية محتملة لم يرد ذكرها في نشرة العبوة هذه.

يمكنك أيضًا الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرةً عبر مخطط البطاقة الصفراء عبر الرابط [.https://yellowcard.mhra.gov.uk/](https://yellowcard.mhra.gov.uk/)

بالإبلاغ عن الآثار الجانبية، فإنك بذلك تساعدين في تقديم المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

WWW.IBSAPHARMA.CO.UK  
+44 (0)1923 233 466  
الهاتف:

IBSA Pharma Limited

---

Sullivan House,  
4-6 Colonial Business Park,  
Colonial Way,  
Watford WD24 4PR